

フジコナカイガラムシ情報第1号

平成24年5月25日
愛知県農業総合試験場
環境基盤研究部病害虫防除室

フジコナカイガラムシの防除適期は、
昨年より1～5日早い6月5日～11日です。

1 フジコナカイガラムシの防除適期

フジコナカイガラムシの成虫、卵、2～3齢幼虫はロウ物質に覆われ薬液をはじいてしまうため、農薬による防除効果はほとんど期待できません（図1ア、イ）。防除適期は、ロウ物質に覆われないふ化幼虫の発生時期に限られます（図1ウ）。そのため、ふ化幼虫発生時期が揃っている第1世代幼虫のふ化時期を把握し、適期に防除することが重要です。




図1 フジコナカイガラムシの成虫、卵のう、ふ化幼虫

2 防除適期予測

有効積算温度を利用したフジコナカイガラムシ第1世代ふ化幼虫の発生ピーク予測日は、6月5日から6月11日です（表1）。

本年は4月中旬以降の平均気温が昨年より高く推移したため、第1世代ふ化幼虫の発生ピーク日は、昨年より1～5日早いと予測します。

表1 フジコナカイガラムシの第1世代ふ化幼虫発生ピーク予測日

	愛西	東海	南知多	名古屋	豊田	岡崎	蒲郡	新城	豊橋	伊良湖
本年予測	6/9	6/5	6/11	6/5	6/10	6/10	6/8	6/11	6/11	6/9
(昨年)	6/14	6/8	6/14	6/9	6/13	6/11	6/12	6/14	6/12	6/13
昨年差	5日早い	3日早い	3日早い	4日早い	3日早い	1日早い	4日早い	3日早い	1日早い	4日早い

注) 各地のアメダス平均気温から予測。5月24日までは本年実測値を、それ以降は平年値（豊橋は昨年値）を用いて計算。昨年については、昨年気温の実測値を用いて計算。

3 ふ化状況の確認

フジコナカイガラムシのふ化時期は、地域や場によって若干異なります。そのため、各場内の卵のふ化状況を確認して防除適期を把握することが重要です。

【ふ化状況確認方法】

- ① 表1のふ化幼虫発生ピーク予測日の10日前頃に卵のうが多く発生するので、昨年発生が多かった樹の剪定傷跡や粗皮の隙間から、卵のうを2、3個採取します。
- ② 卵のうをシャーレ等の容器の中心におき、容器の縁にワセリン（軟膏やハンドクリームでも可）を塗り、容器を納屋など直射日光が当たらない場所に置き、毎日ふ化状況を確認します。
- ③ 卵のうからふ化した幼虫がワセリンに多数付着し、歩行している幼虫も多く見られるときが防除適期のふ化幼虫発生ピーク時期です（図2）。




図2 ふ化幼虫発生ピーク時の状況（左）とワセリンに付着したふ化幼虫（右）

4 防除方法

- (1) 防除適期は、ふ化幼虫の発生時期が比較的揃う第1世代のふ化幼虫発生ピーク時期です。
- (2) 昨年、発生が多かったほ場では、表1を参考に第1世代ふ化幼虫の発生ピーク日を予想し、上記の【ふ化状況確認方法】により各ほ場のふ化幼虫発生ピークを確認し、防除を実施しましょう（表2）。
- (3) アプロード水和剤（フロアブル）は遅効性ですが、残効性に優れているため、幼虫のふ化を確認したら速やかに散布しましょう。
- (4) 敷布ムラがないように、十分な薬液量を丁寧に散布しましょう。

表2 フジコナカイガラムシの主な防除薬剤

作物名	薬剤名	作物名	薬剤名
モモ	アプロード水和剤	カキ	アドマイヤー顆粒水和剤
	サイアノックス水和剤		モスピラン水溶剤
	マラソン乳剤		スプラサイド水和剤
ナシ	アプロード水和剤		スタークル／アルバリン顆粒水溶剤
	アドマイヤー顆粒水和剤	ブドウ	アプロードフロアブル
	モスピラン水溶剤		アドマイヤー顆粒水和剤
	スタークル／アルバリン顆粒水溶剤		モスピラン水溶剤
			スタークル／アルバリン顆粒水溶剤

なお、薬剤は、ラベルを確認し収穫前日数に注意して使用してください。