

## 1 概況

知多西岸地区北部及び西三河地区では、20日から冷蔵網の出庫が始まりました。一方、知多西岸地区中南部及び知多東岸地区では適宜冷蔵網の出庫が始まる予定です。冷蔵網を持たないまたは冷蔵網の張り替えがまだ開始されていない漁場では秋芽網の1～4回目の摘採を行っています。

知多半島沿岸域の栄養塩は先週と比べて概ね増加していますが、南部で不足傾向です。西三河地区の栄養塩は十分あります。植物プランクトンは、全地区で少ない状態が続いています。

水試ブイ観測の平均水温及び漁業生産研究所の観測水温は平年より低い値で推移しています。低気温や低水温の影響が食害が軽減している漁場もあるようですが、食害が完全に収束するまで対策を継続してください。

## 2 気象・海況

&lt;水温&gt; 12月25日

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 2～3号<br>ブイ平均<br>(-3.5m) | 日平均水温 | 9.8℃  |
|                         | 平年差   | -0.6℃ |

&lt;水温&gt; 12月26日

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 漁生研<br>(-1.0m) | 10時水温 | 12.4℃ |
|                | 平年差   | -0.2℃ |

&lt;潮位偏差&gt; 12月25日

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 名古屋港 | 5日平均※ | ±0 cm |
|      | 偏差    | -5 cm |

※12月20日～25日までの平均

&lt;栄養塩・赤潮&gt; (各のり研究会調査)

| 地区     | 栄養塩                       | 赤潮 | 特記事項             |
|--------|---------------------------|----|------------------|
| 知多西岸地区 | 北中部: やや多い～やや少ない、南部: やや少ない | なし | 植物プランクトンは散見      |
| 知多東岸地区 | やや少ない～少ない                 | なし | 植物プランクトンはほとんどいない |
| 西三河地区  | 多い～やや多い                   | なし | 植物プランクトンは散見      |
| 東三河地区  | 本年度の調査終了                  |    |                  |

※基準(単位:  $\mu\text{g/L}$ ) 多い: 121～、やや多い: 81～120、やや少ない: 41～80、少ない: ～40

※植物プランクトン基準(単位: 細胞/mL) 多い: 10,000～、やや多い: 5,000～10,000、少ない: 1,000～5,000、散見: 100～1,000、ほとんどいない: ～100

&lt;気温動向の予測&gt; (気象庁予報より 予報期間: 12月27日～1月1日)

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 今後1週間 | 平均気温は概ね平年並みで推移しますが、期間の前半では低い日が、期間の後半では高い日があるでしょう。 |
|-------|---------------------------------------------------|

## 3 クロノリ養殖状況

| 地区     | 摘採回数                 | 1網当たりの生産枚数 | 製 品            | 食害   | 病障害            | 冷蔵網の張り込み等        |
|--------|----------------------|------------|----------------|------|----------------|------------------|
| 知多西岸地区 | 秋芽: 1～4回<br>冷蔵: 伸び待ち | 500～1,000  | 概ね良好<br>一部にC系統 | カモ、魚 | 目立った病障害<br>はなし | 20日から冷蔵網<br>出庫開始 |
| 知多東岸地区 | 1～3回                 | 300～600    | 概ね良好           | カモ、魚 | なし             | 適宜張り替え予定         |
| 西三河地区  | 秋芽: 3回<br>冷蔵: 伸び待ち   | 300～400    | 良好             | カモ   | なし             | 20日から冷蔵網<br>出庫開始 |
| 東三河地区  | 1回                   | 800～1,000  | 良好             | カモ   | なし             | 張り替えなし           |

## 4 今後の管理


- ① 食害が発生している漁場では、防除網等の対策に努めること。
- ② 早期摘採と摘採後の適切な養殖管理を励行し、病障害の予防と製品の向上に努めること。

水産試験場が提供する「のり養殖情報」、「赤潮情報」及び「自動観測ブイ情報」は、インターネット上で閲覧することが出来ます。  
水産試験場ウェブページのトップページから移動できます。アドレス: <https://www.pref.aichi.jp/suisanshiken/>


内容に関する問い合わせ、ご意見は、愛知県水産試験場 企画普及グループ(TEL 0533-68-5198)へ  
次回は1月9日(木)発行予定です。

## 伊勢湾・三河湾海況データ


水試自動観測ブイ日平均表層水温（2～3号ブイの平均）




漁業生産研究所(豊浜)地先表層水温



名古屋港潮位偏差



## 栄養塩調査結果



栄養塩調査日：知多：12月26日（木） 西三河：12月25日（水） 東三河：調査終了  
 調査機関：知多のり研究会、西三のり研究会、東三のり研究会