

# 第5章 フロン類等環境調査

## 1 目 的

オゾン層の破壊、温室効果ガスとなるフロン類等について、環境中の濃度の測定を行い、実態を把握するとともに、オゾン層保護のための対策に必要な基礎資料を得る。

## 2 調査方法

### (1) 調査地点

図5-1に示す次の3地点で調査を実施しました。

- ① 豊川市役所 [豊川市金屋西町三丁目11] : 以下、「豊川市」とする。
- ② 小牧高校 [小牧市小牧一丁目321] : 以下、「小牧市」とする。
- ③ 安城農林高校 [安城市池浦町茶筌木1] : 以下、「安城市」とする。




図5-1 調査地点

## (2) 調査項目

表5-1に示す8項目について調査を実施しました。

表5-1 調査項目

調査地点	調査対象項目 性質	HFC-134a	CFC-11 CFC-12 CFC-113	HCFC-22 HCFC-141b	四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン
	温室効果ガス	○	○	○	○
	オゾン層破壊物質		○	○	○
豊川市		○	○	○	○
小牧市		○	○	○	○
安城市		○	○	○	○

## (3) 調査期間

調査期間は表5-2のとおりです。

表5-2 調査期間

調査時期	調査日
第1回(春季)	2024年5月28日～5月29日
第2回(夏季)	2024年8月6日～8月7日(小牧高校) 2024年8月7日～8月8日(安城農林高校、豊川市役所)
第3回(秋季)	2024年11月12日～11月13日
第4回(冬季)	2025年2月4日～2月5日

## (4) 試料採取方法及び分析方法

調査項目ごとの試料採取方法及び分析方法を表5-3に示します。

表5-3 試料採取方法及び分析方法

調査項目	試料採取方法	分析方法
HFC-134a	キャニスターにより試料を採取	ガスクロマトグラフ質量分析装置により測定
CFC-11、CFC-12、 CFC-113		
HCFC-22 HCFC-141b		
四塩化炭素		
1,1,1-トリクロロエタン		

### 3 調査結果

各調査項目の結果を表5-4に示します。また、調査項目ごとの年平均値の経年変化を表5-5及び図5-2に示します。

全ての調査項目の濃度は前年度と同等でした。また、「令和5年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）において都市域に選定されている川崎市と比較して、同等かそれ以下でした。

表5-4 フロン類等の調査結果（1）

調査地点	HFC-134a (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.18	(0.14)	0.22	0.16	0.15
小牧市	0.18	(0.14)	0.21	0.18	0.15
安城市	0.17	(0.17)	0.18	0.17	0.15
県平均	0.17	/			
(川崎市) 注1	0.18				
(北海道) 注1	0.14				

(注1) 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均（検出下限値未満の測定値は、検出下限値の 1/2 を代入）により算出した。

川崎市のデータは2023年3月～2024年2月の中央値。

北海道のデータは2023年8月、2023年12月の平均値。

「令和5年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）

(注2) ( ) 内の数値は、分析機器故障のため参考値とし、平均値の算出から除外した。

表5-4 フロン類等の調査結果(2)

調査地点	CFC-11 (ppb)					CFC-12 (ppb)						
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回		
豊川市	0.20	(0.21)	0.20	0.21	0.20	0.47	(0.46)	0.46	0.49	0.46		
小牧市	0.21	(0.20)	0.20	0.21	0.21	0.49	(0.47)	0.47	0.49	0.51		
安城市	0.21	(0.21)	0.20	0.21	0.21	0.47	(0.48)	0.45	0.48	0.47		
県平均	0.21	/					0.48	/				
(川崎市) <sup>注1</sup>	0.23						0.52					
(北海道) <sup>注1</sup>	0.22						0.51					

調査地点	CFC-113 (ppb)					
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	
豊川市	0.059	(0.07*)	0.055	0.061	0.062	
小牧市	0.060	(0.08*)	0.056	0.059	0.066	
安城市	0.059	(0.07*)	0.052	0.060	0.066	
県平均	0.060	/				
(北海道) <sup>注1</sup>	0.071					

調査地点	HCFC-22 (ppb)					HCFC-141b (ppb)						
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回		
豊川市	0.23	(0.31)	0.22	0.20	0.26	0.029	(0.021*)	0.030	0.027	0.029		
小牧市	0.23	(0.27)	0.23	0.20	0.25	0.029	(0.022*)	0.031	0.028	0.027		
安城市	0.22	(0.26)	0.22	0.20	0.25	0.031	(0.017*)	0.032	0.032	0.029		
県平均	0.23	/					0.029	/				
(川崎市) <sup>注1</sup>	0.30						0.042					
(北海道) <sup>注1</sup>	0.27						0.028					

調査地点	四塩化炭素 (ppb)					1,1,1-トリクロロエタン (ppb)						
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回		
豊川市	0.086	(0.100)	0.085	0.085	0.087	0.0014	(0.009*)	<0.0026	<0.0021	<0.003		
小牧市	0.084	(0.089)	0.080	0.085	0.086	0.0015	<0.007	<0.0027	<0.0022	<0.003		
安城市	0.085	(0.096)	0.081	0.085	0.088	0.0015	<0.007	<0.0027	<0.0022	<0.003		
県平均	0.085	/					0.0015	/				
(北海道) <sup>注1</sup>	0.077						0.0010					

(注1) 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均(検出下限値未満の測定値は、検出下限値の1/2を代入)により算出した。

川崎市のデータは2023年3月～2024年2月の中央値。

北海道のデータは2023年8月、2023年12月の平均値。

「令和5年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」(環境省)

(注2) 検出下限値以上定量下限値未満については測定値の後に(\*)を記入した。

(注3) ()内の数値は、分析機器故障のため参考値とし、平均値の算出から除外した。

表5-5 フロン類等の年平均値の経年変化

項目	年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HFC-134a (ppb)		0.18	0.15	0.18	0.15	0.14	0.16	0.16	0.17	0.15	0.17
CFC-11 (ppb)		0.27	0.26	0.28	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21
CFC-12 (ppb)		0.61	0.60	0.70	0.59	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48
CFC-113 (ppb)		0.075	0.073	0.078	0.070	0.062	0.068	0.065	0.063	0.064	0.060
HCFC-22 (ppb)		0.40	0.37	0.37	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.26	0.23
HCFC-141b (ppb)		0.034	0.031	0.032	0.027	0.016	0.027	0.025	0.023	0.020	0.029
四塩化炭素 (ppb)		0.084	0.079	0.095	0.081	0.087	0.12	0.10	0.090	0.090	0.085
1,1,1-トリクロロエタン (ppb)		0.003	0.003	0.002	0.0032	0.003	0.003	0.002	0.0009	0.0010	0.0015





図5-2 フロン類等の年平均値の経年変化 (1)





図5-2 フロン類等の年平均値の経年変化(2)