長良川取水口　令和8年10月6日

| | | 長良川取水口 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 曇 |
| 天候当日 | | 晴 |
| 気温 | ℃ | 24.4 |
| 水温 | ℃ | 22.2 |
| 一般細菌 | 個/mL | 3,100 |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | 41 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.20 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.022 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 4 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | 3 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.9 |
| pH値 | | 7.4 |
| 臭気 | | 厨芥臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 2.8 |
| 濁度 | 度 | 3.8 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 10.4 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 31.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.03 |
| 透明度 | m | |
| 溶存酸素 | mg/L | 8.1 |
| 酸素飽和百分率 | % | 94 |
| 全窒素 | mg/L | 0.75 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.67 |
| リン酸イオン | mg/L | 0.08 |
| 全リン | mg/L | 0.046 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.032 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 11.8 |
| クロロフィルa | μg/L | 4.5 |
| 生物総数 | /mL | 33 |

長良川取水口　令和8年10月6日

| | | |
|---|---|---|
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| Aulacoseira granu. var. ang. f. spiralis | 細胞 | 1 |
| A. sp. | 細胞 | 1 |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 4 |
| Synedra spp. | 細胞 | 3 |
| Pinnularia sp. | 細胞 | 1 |
| Navicula spp. | 細胞 | 2 |
| Gomphonema spp. | 細胞 | 8 |
| Amphora ovalis | 細胞 | 1 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 1 |
| Coelastrum sp. | 群体 | 1 |
| Scenedesmus spp. | 群体 | 3 |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | | |
| Cryptomonas spp. | 細胞 | 4 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Peridinium sp. | 細胞 | 2 |
| EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類) | | |
| Phacus sp. | 細胞 | 1 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 33 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

愛知池　令和8年10月5日

| | | 愛知池取水塔 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 曇 |
| 天候当日 | | 曇 |
| 気温 | ℃ | 23.1 |
| 水温 | ℃ | 21.4 |
| 一般細菌 | 個/mL | 260 |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | 1.0 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.07 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.006 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.1 |
| pH値 | | 7.9 |
| 臭気 | | 厨芥臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 3.8 |
| 濁度 | 度 | 3.1 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 4.9 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 16.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | 1.8 |
| 溶存酸素 | mg/L | 10.0 |
| 酸素飽和百分率 | % | 114 |
| 全窒素 | mg/L | 0.30 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.23 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.012 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.005 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 9.8 |
| クロロフィルa | μg/L | 7.3 |
| 生物総数 | /mL | 675 |

愛知池　令和8年10月5日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Merismopedia sp. | 群体 | 2 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| ▲ Aulacoseira granulata | 細胞 | 480 |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 2 |
| Attheya zachariasi | 細胞 | 5 |
| Rhizosolenia longiseta | 細胞 | 5 |
| ▲ Asterionella formosa | 細胞 | 150 |
| Synedra sp. | 細胞 | 5 |
| Nitzschia actinastroides | 細胞 | 2 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Pandorina morum | 群体 | 2 |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 5 |
| Oocystis sp. | 群体 | 2 |
| Scenedesmus sp. | 群体 | 7 |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | | |
| Dinobryon sp. | 細胞 | 8 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 675 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

愛知池　令和8年10月5日 (ﾈｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ)

| | |
|---|---|
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | |
| ▲ Aulacoseira granulata | ccc |
| Attheya zachariasi | rrr |
| ▲ Fragilaria crotonensis | rr |
| ▲ Asterionella formosa | rr |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | |
| Pandorina morum | rrr |
| Sphaerocystis schroeteri | rrr |
| Tetrasporales sp. | rrr |
| Staurastrum sp. | rrr |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | |
| Mallomonas sp. | rrr |
| Dinobryon sp. | rr |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | |
| Ceratium hirundinella | rrr |
| RHIZOPODA(根足虫類) | |
| Heliozoa sp. | rr |

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

佐布里池　令和8年10月5日

| | | 佐布里池取水塔 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 曇 |
| 天候当日 | | 曇 |
| 気温 | ℃ | 23.5 |
| 水温 | ℃ | 23.4 |
| 一般細菌 | 個/mL | 340 |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | 8.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.07 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 1 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.4 |
| pH値 | | 7.9 |
| 臭気 | | 厨芥臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 3.7 |
| 濁度 | 度 | 2.7 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 5.0 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 15.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | 2.0 |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.5 |
| 酸素飽和百分率 | % | 112 |
| 全窒素 | mg/L | 0.32 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.24 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.013 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.006 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 9.3 |
| クロロフィルa | μg/L | 6.7 |
| 生物総数 | /mL | 605 |

佐布里池　令和8年10月5日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Merismopedia sp. | 群体 | 21 |
| Microcystis viridis | 群体 | 2 |
| Aphanocapsa sp. | 群体 | 7 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| ▲ Aulacoseira granulata | 細胞 | 83 |
| A. sp. | 細胞 | 60 |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 14 |
| Attheya zachariasi | 細胞 | 10 |
| Rhizosolenia longiseta | 細胞 | 16 |
| ▲ Synedra acus | 細胞 | 2 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Elakatothrix gelatinosa | 群体 | 1 |
| Pediastrum sp. | 群体 | 6 |
| Coelastrum sp. | 群体 | 34 |
| Oocystis sp. | 群体 | 200 |
| Selenastrum sp. | 群体 | 5 |
| Ankistrodesmus falcatus | 細胞 | 49 |
| Schroederia setigera | 細胞 | 44 |
| Scenedesmus sp. | 群体 | 4 |
| CHLOROPHYCEAE others | | 1 |
| Tetraedeon sp. | 細胞 | 3 |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | | |
| Cryptomonas spp. | 細胞 | 24 |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | | |
| Mallomonas sp. | 細胞 | 14 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Peridinium sp. | 細胞 | 2 |
| EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類) | | |
| Euglena spp. | 細胞 | 3 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 605 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞）

佐布里池　令和8年10月5日 (ﾈｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ)

| | |
|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | |
| Microcystis viridis | rrr |
| □ Anabaena sp. (らせん状) | rrr |
| Aphanizomenon sp. | rrr |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | |
| ▲ Aulacoseira granulata | cc |
| A. granu. var. ang. f. spiralis | rrr |
| A. sp. | c |
| Attheya zachariasi | rrr |
| Rhizosolenia longiseta | rrr |
| ▲ Fragilaria crotonensis | rrr |
| ▲ Asterionella formosa | rrr |
| Synedra sp. | rrr |
| Cymbella sp. | rrr |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | |
| Eudorina elegans | rrr |
| Pediastrum sp. | rrr |
| Dictyosphaerium pulchellum | rrr |
| Coelastrum sp. | rrr |
| Staurastrum sp. | rrr |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | |
| Cryptomonas spp. | rrr |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | |
| Mallomonas sp. | rrr |
| Dinobryon sp. | rrr |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | |
| Gymnodinium sp. | rrr |
| Peridinium sp. | rrr |
| Ceratium hirundinella | rrr |
| RHIZOPODA(根足虫類) | |
| Difflugia sp. | rrr |
| Heliozoa sp. | rrr |
| ROTATORIA(輪虫類) | |
| Hexarthra mira | rrr |
| Polyarthra vulgaris | rrr |
| Ploesoma sp. | rrr |
| Trichocerca sp. | rrr |
| Keratella sp. | rrr |
| CRUSTACEA(甲殻類) | |
| Cyclopidae sp. | rrr |
| Daphniidae sp. | rrr |
| LARVA(幼生) | |
| Nauplius larva | rrr |

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞）

岩屋ダム　令和8年10月7日

| | | 岩屋ダム表層 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 晴 |
| 気温 | ℃ | 19.4 |
| 水温 | ℃ | 17.8 |
| 一般細菌 | 個/mL | |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.003 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | < 1 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.8 |
| pH値 | | 7.5 |
| 臭気 | | 藻臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 2.2 |
| 濁度 | 度 | 1.5 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 3.9 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 15.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.6 |
| 酸素飽和百分率 | % | 100 |
| 全窒素 | mg/L | 0.18 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.14 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.007 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.003 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 11.0 |
| クロロフィルa | μg/L | 4.2 |
| 生物総数 | /mL | 117 |

岩屋ダム　令和8年10月7日

| | | |
|---|---|---|
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 3 |
| Rhizosolenia longiseta | 細胞 | 58 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Elakatothrix gelatinosa | 群体 | 5 |
| Staurastrum sp. | 細胞 | 2 |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | | |
| Mallomonas sp. | 細胞 | 3 |
| Dinobryon sp. | 細胞 | 25 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Peridinium sp. | 細胞 | 12 |
| Ceratium hirundinella | 細胞 | 9 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 117 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞）

矢作ダム　令和8年10月14日

| | | 矢作ダム表層 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 雨のち晴 |
| 気温 | ℃ | 19.8 |
| 水温 | ℃ | 21.6 |
| 一般細菌 | 個/mL | |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.02 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.002 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | < 1 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 2.6 |
| pH値 | | 9.2 |
| 臭気 | | 厨芥臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 3.5 |
| 濁度 | 度 | 4.2 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 4.5 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 17.5 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.8 |
| 酸素飽和百分率 | % | 112 |
| 全窒素 | mg/L | 0.26 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.10 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.014 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.008 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 11.8 |
| クロロフィルa | μg/L | 19.6 |
| 生物総数 | /mL | 1,628 |

矢作ダム　令和8年10月14日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Microcystis aeruginosa | 群体 | 5 |
| □ Anabaena sp. (らせん状) | 巻 | 25 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| Attheya zachariasi | 細胞 | 5 |
| Rhizosolenia longiseta | 細胞 | 30 |
| ▲ Asterionella formosa | 細胞 | 65 |
| ▲ Synedra acus | 細胞 | 45 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 2 |
| Oocystis sp. | 群体 | 4 |
| Staurastrum spp. | 細胞 | 1,400 |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | | |
| Mallomonas sp. | 細胞 | 1 |
| ● Uroglena americana | 群体 | 5 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Peridinium sp. | 細胞 | 41 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 1,628 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

宇連ダム　令和8年10月13日

| | | 宇連ダム表層 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 晴 |
| 気温 | ℃ | 26.6 |
| 水温 | ℃ | 23.3 |
| 一般細菌 | 個/mL | |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.04 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.002 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | < 1 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 2.4 |
| pH値 | | 7.6 |
| 臭気 | | 厨芥臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 6.8 |
| 濁度 | 度 | 0.7 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 8.5 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 10.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | |
| 溶存酸素 | mg/L | 8.4 |
| 酸素飽和百分率 | % | 101 |
| 全窒素 | mg/L | 0.36 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.32 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.005 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.004 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 9.3 |
| クロロフィルa | μg/L | 1.2 |
| 生物総数 | /mL | 18 |

宇連ダム　令和8年10月13日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Aphanocapsa sp. | 群体 | 3 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 1 |
| Achnanthes spp. | 細胞 | 3 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Elakatothrix gelatinosa | 群体 | 1 |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 7 |
| Tetrasporales sp. | 細胞 | 2 |
| CHLOROPHYCEAE others | | 1 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 18 |

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

大島ダム　令和8年10月13日

| | | 大島ダム表層 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 晴 |
| 気温 | ℃ | 25.8 |
| 水温 | ℃ | 23.9 |
| 一般細菌 | 個/mL | |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.008 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | 14 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3.3 |
| pH値 | | 9.4 |
| 臭気 | | カビ臭 |
| 臭気強度(TON) | | 2 |
| 色度 | 度 | 4.3 |
| 濁度 | 度 | 3.0 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 5.7 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 19.5 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | |
| 溶存酸素 | mg/L | 10.2 |
| 酸素飽和百分率 | % | 122 |
| 全窒素 | mg/L | 0.37 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.22 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.013 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.006 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 9.0 |
| クロロフィルa | μg/L | 32.3 |
| 生物総数 | /mL | 291 |

大島ダム　令和8年10月13日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Microcystis spp. | 群体 | 14 |
| □ Phormidium sp. | 糸状体 | 7 |
| □ Anabaena spp. | 10細胞 | 3 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 48 |
| Stephanodiscus sp. | 細胞 | 1 |
| Synedra sp. | 細胞 | 1 |
| Nitzschia actinastroides | 細胞 | 7 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Elakatothrix gelatinosa | 群体 | 1 |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 5 |
| Tetrasporales sp. | 細胞 | 14 |
| Oocystis sp. | 群体 | 1 |
| Scenedesmus sp. | 群体 | 44 |
| Tetraedeon sp. | 細胞 | 52 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Glenodinium sp. | 細胞 | 2 |
| Peridinium sp. | 細胞 | 84 |
| EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類) | | |
| Lepocinclis sp. | 細胞 | 1 |
| Trachelomonas sp. | 細胞 | 6 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 291 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

駒場池　令和8年10月13日

| | | 駒場池取水塔 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 晴 |
| 気温 | ℃ | 27.7 |
| 水温 | ℃ | 24.3 |
| 一般細菌 | 個/mL | 130 |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | < 1 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.04 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.007 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.9 |
| pH値 | | 8.5 |
| 臭気 | | 藻臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 4.7 |
| 濁度 | 度 | 1.6 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 6.2 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 20.5 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | 3.4 |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.4 |
| 酸素飽和百分率 | % | 114 |
| 全窒素 | mg/L | 0.30 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.23 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.010 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.005 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 11.8 |
| クロロフィルa | μg/L | 5.3 |
| 生物総数 | /mL | 167 |

駒場池　令和8年10月13日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| □ Phormidium sp. | 糸状体 | 1 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| ▲ Aulacoseira granulata | 細胞 | 5 |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 33 |
| Attheya zachariasi | 細胞 | 1 |
| ▲ Asterionella formosa | 細胞 | 8 |
| ▲ Synedra acus | 細胞 | 1 |
| S. spp. | 細胞 | 7 |
| Achnanthes spp. | 細胞 | 34 |
| Diploneis ovalis | 細胞 | 1 |
| Navicula spp. | 細胞 | 2 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 2 |
| Tetrasporales sp. | 細胞 | 2 |
| Golenkinia radiata | 細胞 | 1 |
| Micractinium pussillum | 群体 | 1 |
| Ankistrodesmus falcatus | 細胞 | 2 |
| Scenedesmus spp. | 群体 | 1 |
| Tetraedeon sp. | 細胞 | 2 |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | | |
| Cryptomonas spp. | 細胞 | 4 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Glenodinium sp. | 細胞 | 9 |
| Peridinium sp. | 細胞 | 46 |
| EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類) | | |
| Lepocinclis sp. | 細胞 | 4 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 167 |

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

駒場池　令和8年10月13日 (ネットサンプル)

| | |
|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | |
| Microcystis sp. | rrr |
| □ Phormidium spp. | rrr |
| □ Anabaena spp. | r |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | |
| ▲ Aulacoseira granulata | cc |
| A. granu. var. ang. f. spiralis | rrr |
| Attheya zachariasi | rrr |
| ▲ Fragilaria crotonensis | r |
| ▲ Asterionella formosa | r |
| Synedra spp. | rrr |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | |
| Sphaerocystis schroeteri | rrr |
| Tetrasporales sp. | rrr |
| Pediastrum sp. | rrr |
| Staurastrum sp. | rrr |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | |
| Cryptomonas spp. | rrr |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | |
| Dinobryon sp. | rrr |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | |
| Peridinium sp. | rrr |
| Ceratium hirundinella | rrr |
| RHIZOPODA(根足虫類) | |
| Heliozoa sp. | rrr |
| ROTATORIA(輪虫類) | |
| Collotheca sp. | rrr |
| Synchaeta sp. | rrr |
| Polyarthra vulgaris | rrr |
| Ploesoma sp. | rrr |
| Keratella sp. | rrr |
| Notholca sp. | rrr |
| CRUSTACEA(甲殻類) | |
| Daphniidae sp. | rrr |

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

三ツ口池　令和8年10月14日

| | | 三ツ口池取水塔 |
|---|---|---|
| 採水水深 | m | |
| 天候前日 | | 晴 |
| 天候当日 | | 雨のち晴 |
| 気温 | ℃ | 24.1 |
| 水温 | ℃ | 23.2 |
| 一般細菌 | 個/mL | 570 |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | 2.0 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.05 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.013 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 2 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.4 |
| pH値 | | 7.8 |
| 臭気 | | 藻臭 |
| 臭気強度(TON) | | |
| 色度 | 度 | 3.5 |
| 濁度 | 度 | 2.6 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | |
| 電気伝導度 | mS/m | 7.6 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 24.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 |
| 透明度 | m | 1.5 |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.0 |
| 酸素飽和百分率 | % | 107 |
| 全窒素 | mg/L | 0.38 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.32 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.012 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.007 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 11.8 |
| クロロフィルa | μg/L | 3.8 |
| 生物総数 | /mL | 456 |

三ツ口池　令和8年10月14日

| | | |
|---|---|---|
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| ▲ Aulacoseira granulata | 細胞 | 8 |
| Attheya zachariasi | 細胞 | 4 |
| Rhizosolenia longiseta | 細胞 | 36 |
| ▲ Fragilaria crotonensis | 細胞 | 8 |
| ▲ Asterionella formosa | 細胞 | 4 |
| Cymbella sp. | 細胞 | 1 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 27 |
| Pediastrum sp. | 群体 | 2 |
| Oocystis sp. | 群体 | 12 |
| Selenastrum sp. | 群体 | 7 |
| Actinastrum hantzschii | 群体 | 2 |
| Staurastrum sp. | 細胞 | 2 |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | | |
| Dinobryon sp. | 細胞 | 340 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Ceratium hirundinella | 細胞 | 3 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 456 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

三ツ口池　令和8年10月14日 (ﾈｯﾄｻﾝﾌﾟﾙ)

| | |
|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | |
| Microcystis aeruginosa | rr |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | |
| ▲ Aulacoseira granulata | c |
| A. granu. var. ang. f. spiralis | rr |
| Melosira varians | rr |
| ▲ Fragilaria crotonensis | r |
| ▲ Asterionella formosa | + |
| Pinnularia sp. | rr |
| Navicula spp. | rr |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | |
| Pediastrum sp. | rr |
| Staurastrum sp. | rr |
| CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類) | |
| Dinobryon sp. | + |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | |
| Ceratium hirundinella | rr |
| ROTATORIA(輪虫類) | |
| Hexarthra mira | rr |
| Synchaeta sp. | rr |
| Keratella sp. | rr |

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞)

万場調整池　令和8年10月14日

| | | 万場調整池取水塔 | 万場調整池中層 | 万場調整池底層 |
|---|---|---|---|---|
| 採水水深 | m | | 9 | 18.5 |
| 天候前日 | | 晴 | 晴 | 晴 |
| 天候当日 | | 雨のち晴 | 雨のち晴 | 雨のち晴 |
| 気温 | ℃ | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 水温 | ℃ | 23.9 | 23.3 | 22.9 |
| 一般細菌 | 個/mL | 52 | | |
| 大腸菌(MPN) | /100mL | < 1 | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.004 | 0.023 |
| ジェオスミン(別名) | ng/L | 8 | 12 | 16 |
| 2-メチルイソボルネオール(別名) | ng/L | < 1 | < 1 | < 1 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| pH値 | | 8.1 | 7.6 | 7.3 |
| 臭気 | | 藻臭 | 厨芥臭 | 腐敗臭 |
| 臭気強度(TON) | | | | 1 |
| 色度 | 度 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| 濁度 | 度 | 1.5 | 1.2 | 2.2 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | | |
| 電気伝導度 | mS/m | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| 総アルカリ度 | mg/L | 18.5 | 18.0 | 19.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/L | < 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 透明度 | m | 4.0 | | |
| 溶存酸素 | mg/L | 9.1 | 7.1 | 3.3 |
| 酸素飽和百分率 | % | 109 | 84 | 38 |
| 全窒素 | mg/L | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| 全窒素(溶存態) | mg/L | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| リン酸イオン | mg/L | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| 全リン | mg/L | 0.007 | 0.009 | 0.014 |
| 全リン(溶存態) | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
| 溶性ケイ酸 | mg/L | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| クロロフィルa | μg/L | 4.2 | 7.2 | 6.3 |
| 生物総数 | /mL | 255 | | |

万場調整池　令和8年10月14日

| | | |
|---|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | | |
| Microcystis aeruginosa | 群体 | 4 |
| □ Anabaena sp. (らせん状) | 巻 | 1 |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | | |
| ▲ Aulacoseira granulata | 細胞 | 12 |
| A. distans | 細胞 | 17 |
| Cyclotella spp. | 細胞 | 21 |
| Achnanthes spp. | 細胞 | 15 |
| Navicula spp. | 細胞 | 7 |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | | |
| Elakatothrix gelatinosa | 群体 | 4 |
| Sphaerocystis schroeteri | 群体 | 6 |
| Tetrasporales sp. | 細胞 | 11 |
| Coelastrum sp. | 群体 | 7 |
| Oocystis sp. | 群体 | 9 |
| Kirchneriella sp. | 群体 | 12 |
| Ankistrodesmus falcatus | 細胞 | 81 |
| Staurastrum spp. | 細胞 | 28 |
| CHLOROPHYCEAE others | | 15 |
| CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類) | | |
| Cryptomonas spp. | 細胞 | 4 |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | | |
| Ceratium hirundinella | 細胞 | 1 |
| TOTAL NUMBERS(/mL) | | 255 |

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞）

万場調整池　令和8年10月14日 (ネットサンプル)

| | |
|---|---|
| CYANOPHYCEAE(藍藻類) | |
| Microcystis aeruginosa | rrr |
| M. viridis | rrr |
| M. wesenbergii | rrr |
| □ Anabaena sp. (らせん状) | rrr |
| BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類) | |
| ▲ Aulacoseira granulata | c |
| A. sp. | rrr |
| ▲ Asterionella formosa | rrr |
| Navicula spp. | rrr |
| CHLOROPHYCEAE(緑藻類) | |
| Eudorina elegans | rrr |
| Sphaerocystis schroeteri | rrr |
| Kirchneriella sp. | rrr |
| Ankistrodesmus falcatus | rrr |
| Staurastrum spp. | cc |
| DINOPHYCEAE(渦鞭藻類) | |
| Peridinium sp. | rrr |
| Ceratium hirundinella | rrr |
| RHIZOPODA(根足虫類) | |
| Heliozoa sp. | rrr |
| ROTATORIA(輪虫類) | |
| Polyarthra vulgaris | rrr |
| Trichocerca sp. | rrr |
| CRUSTACEA(甲殻類) | |
| Cyclopidae sp. | rrr |
| Daphniidae sp. | rrr |

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（■:カビ臭　□:カビ臭産生種含む　●:生ぐさ臭　▲:ろ過閉塞）